

Mpox (猴痘)

您需要了解的知识



ACT
Government

ACT Health


Simplified Chinese | 简体中文

mpox是一种病毒感染,可引起身体部位的皮疹或溃疡。

它主要是通过人传人的方式传播,经由与有皮疹或溃疡的感染者直接皮肤接触传染。这可能会在性交的时候发生。

猴痘也可以通过直接接触被污染的物品,如床上用品、毛巾或衣服传播,但这种情况不太常见。

症状



大多数mpox感染者会出现皮疹、丘疹样病变或溃疡:

- 这可能会出现在身体的任何部位,包括生殖器、肛门或臀部、面部、手臂以及腿部。
- 溃疡会经历不同阶段的变化。在最后阶段会变成结痂。
- 部分mpox感染者可能只会注意到生殖器区域或臀部的一些丘疹样病变。

可能出现的其他症状有:



发烧



发冷



头疼



肌肉和关节疼痛



淋巴结肿大

症状通常在感染接触后的7-14天开始出现,但也可能短至几天,或长至21天。

诊断

如怀疑自己感染了mpox,请咨询全科医生或致电 **(02) 5124 2184**与 Canberra Sexual Health Clinic 联系。

如需外出(包括外出就医的情况),请遮盖有皮疹或病变的部位,并戴上口罩。

感染病例大多为轻症,但有症状的感染者必须由医务人员进行检查。

疫苗接种

ACT 政府批准的疫苗接种中心现已提供mpox疫苗接种,服务对象为:

- 男同性恋、双性恋或与其他男性发生性关系的性活跃男性(顺性别和跨性别人士)
- 以上人群的伴侣
- 性工作者。

没有 Medicare 卡的人士仍可在部分疫苗接种中心接种疫苗。

需间隔至少28天接种两剂疫苗才能完成完全接种。

即使接种了疫苗,也要采取措施来降低暴露或传播mpox的风险,因为接种疫苗后仍有感染的风险。

疫苗接种预约

如需查找疫苗接种中心的地点和联系方式,请浏览网站: www.health.act.gov.au/mpox

