

# Mpox (원숭이두창)

## 알아두어야 할 사항



ACT  
Government

ACT Health


Korean | 한국어

Mpox는 신체 부위에 발진이나 포진을 일으킬 수 있는 바이러스 감염 질환입니다.

주로 발진이나 포진이 있는 사람과의 직접적 피부 접촉을 통해 사람에서 사람으로 전파됩니다. 또한, 성관계를 통하여 전파될 수 있습니다.

더불어, 침구, 수건이나 의복과 같은 오염된 물건과의 직접적 접촉을 통하여 감염이 일어날 수 있으나 이런 경우는 흔하지 않습니다.

### 증상



Mpox에 감염된 사람들에게는 대부분 발진, 뾰루지 같은 병변이나 포진이 나타납니다.

- 발진은 생식기 부위, 항문이나 엉덩이, 또는 얼굴이나 팔 다리 등 신체의 어느 부위에서나 나타날 수 있습니다.
- 발진은 여러 단계를 거치며 변화합니다. 발진은 마지막 단계에서 딱지를 형성합니다.
- Mpox에 감염된 사람들 중 일부는 생식기 부위나 엉덩이에 단지 몇 개의 여드름 같은 병변만을 보일 수도 있습니다.

다음과 같은 다른 증상이 있을 수 있습니다.



열



오한



두통



근육통과 관절통



림프절 부종

증상은 보통 바이러스에 노출된 이후 7-14일 이후에 시작되지만, 짧게는 며칠 이후에, 길게는 21일 이후에 시작될 수도 있습니다.

### 진단

만일 Mpox에 감염되었다고 생각된다면, 주치의(GP)와 상의하거나 Canberra Sexual Health Clinic에 **(02) 5124 2184**로 연락하십시오.

의료진을 만날 때를 포함하여 외출 시 발진이나 병변을 가려주시고, 마스크를 착용하십시오.

대부분은 경미한 경우에 속하지만, 증상이 있는 환자는 의료진에게 확인을 받는 것이 중요합니다.

### 백신 접종

다음 기준에 해당되는 사람은 이제 ACT 정부 승인 백신 센터에서 Mpox 백신 접종을 할 수 있습니다.

- 성적으로 활발한 동성애자, 양성애자 남성 또는 다른 남성과 성관계를 가지는 남성 (시스젠더와 트랜스젠더)
- 위에 언급된 사람들의 파트너
- 성노동자.

Medicare 카드가 없는 경우라도, 이중 일부 백신 센터에서 여전히 백신 접종이 가능합니다.

접종을 완료하려면 최소 28일 간격으로 두 번의 백신 접종이 필요합니다.

백신 접종을 했더라도, 접종 이후 감염의 위험이 여전히 존재하기 때문에, 바이러스에 노출되거나 Mpox를 전파하는 위험을 줄이기 위한 조치를 취하는 것이 여전히 중요합니다.

### 백신 접종 예약

백신 접종 센터의 위치와 연락처는

[www.health.act.gov.au/mpox](http://www.health.act.gov.au/mpox)에서 확인하십시오.

